

عصر پنجشنبه

۱۴۰۱/۳/۵

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه پرستاری

دروس امتحانی و ضرایب امتحانی						رشته امتحانی
زبان عمومی	روان پرستاری	بهداشت جامعه	بهداشت مادران و نوزادان	کودکان	داخلی-جراحی	
۴	۴	۲	۲	۲	۲	روان پرستاری
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری داخلی-جراحی
۴	۲	۴	۲	۲	۲	پرستاری سلامت جامعه
۴	۲	۲	۲	۴	۲	پرستاری کودکان
۴	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری نظامی
۴	۱	۲	۳	۳	۳	پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
۴	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری توانبخشی
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری اورژانس
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری مراقبت های ویژه
۴	۴	۳	۱	۱	۴	پرستاری سالمندی
۴	۴	۳	۱	۲	۳	مدیریت پرستاری

مجموعه پرستاری

به نام خدا

داخلی - جراحی

۱- خانم ۴۰ ساله با سابقه عفونت پیلونفریت مزمن، با درد شدید پهلو که به کشاله ران و کف پرینه تیر می کشد به همراه تهوع و استفراغ به اورژانس مراجعه کرده است. در بررسی به عمل آمده برای وی سنگ کلیه تشخیص داده شد. به منظور کنترل درد در مددجوی فوق چه اقدامی صحیح تر است؟

(الف) استفاده از تکنیک های غیر دارویی کنترل درد

(ب) تزریق داروی شل کننده عضلانی

(ج) مصرف ضد التهاب غیر استروئیدی خوراکی

(د) مصرف مخدرهای تزریقی

۲- در بررسی وضعیت تغذیه ای بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو با تغذیه دهانی، پرستار متوجه می شود که بیمار هنوز اسهال دارد و نسبت به چند روز قبل دچار کاهش وزن شده و تعادل منفی نیتروژن مطرح است، کدام مورد به منظور حمایت تغذیه ای صحیح است؟

(الف) تغذیه لوله ای بینی - معدی

(ب) تغذیه لوله ای بینی - ژژنوم

(ج) تغذیه کامل وریدی

(د) گاستروستومی

۳- آقای ۶۰ ساله با سابقه هیپاتیت سی و سیروز کبدی پیشرفته همراه با آسیت سرکش و تنگی نفس در بخش بستری می باشد. مهم ترین مراقبت پرستاری کدام است؟

(الف) بررسی آنزیم های کبدی

(ب) رژیم پر پروتئین و سدیم

(ج) استراحت در تخت و عدم فعالیت

(د) مصرف مایعات فراوان

۴- بیمار مبتلا به میاستنی گراو دچار ضعف عضلانی شده است و پزشک معالج انجام تست آدروفونیوم (تنسیلون) را تجویز نموده است. پس از تزریق، ضعف عضلانی بیمار شدیدتر شده است. پرستار نتیجه آزمون را چگونه تفسیر می نماید؟

(الف) طبیعی (ب) مثبت (ج) بحران میاستنی گراو (د) بحران کولینرژیک

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

WWW.NOKHBEGAAN.COM

۵- فشار داخل جمجمه بیمار تحت مانیتورینگ، ۱۲ میلی متر جیوه است. از نظر پرستار تفسیر این سطح از فشار چیست؟

الف) تعادل طبیعی بین بافت مغز، خون و مایع CSF

ب) اختلال در تولید مایع مغزی نخاعی

ج) اختلال در کنترل خودکار فشار داخل جمجمه

د) کاهش شدید فشار شرب مغزی

۶- بعد از جایگذاری موفقیت آمیز بالن پمپ داخل آئورت در بیمار با شوک کاردیوژنیک، کدام تغییرات همودینامیک ایجاد می شود؟

الف) کاهش SVR و کاهش SV

ب) کاهش PAWP و افزایش CO

ج) افزایش BP دیاستولیک و کاهش BP سیستولیک

د) کاهش CVP و افزایش فشار دهلیز چپ

۷- بیماری به دلیل کانتیوژن ریه در بیمارستان بستری شده است و در معرض ابتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد (ARDS) قرار دارد، کدامیک از علائم و نشانه های زیر، علامت زودرس بروز ARDS بوده و نیاز به پایش دقیق دارد؟

الف) کراکل و رونکای منتشر در سمع ریه

ب) سیانوز و رنگ پریدگی بیمار

ج) بروز تاکی پنه و تنگی نفس

د) ظاهر سفیدرنگ ریه ها در رادیوگرافی

۸- پرستار با مشاهده مانیتورینگ بیمار بستری در CCU، متوجه بروز تاکیکاردی بطنی حمله ای (PVT) می شود، اولین اقدام وی کدام است؟

الف) اعلام فوری کد احیا قلبی ریوی

ب) بررسی سطح هوشیاری بیمار

ج) آماده سازی شوک دفیبریلیشن

د) آماده سازی شوک کاردیو ورژن

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

WWW.NOKHBEGAAN.COM

۹- آقای ۵۵ ساله با تشخیص سرطان پروستات، دارای سابقه فشار خون، رادیکال پروستاتکتومی شده است. برای کنترل فشار خون بیمار کدام دسته از داروهای زیر احتمال بی اختیاری ادرار

مددجو را تشدید می نماید؟

الف) مهار کننده کانالهای کلسیمی

ب) مهار کننده گیرنده های آلفا آدرنرژیک

ج) مهار کننده آنژیوتانسین - السترین

د) مهار کننده گیرنده های بتا

۱۰- برای بیمار دچار شوک کاردیوژنیک با وزن ۵۰ کیلوگرم، پزشک معالج انفوزیون دوپامین به میزان $4 \frac{\mu\text{g}}{\text{kg}}$ در هر دقیقه را تجویز نموده است. در صورتی که ۲۰۰ میلی گرم آمپول دوپامین در سرنگ ۵۰cc توسط NS رقیق شود، سرعت انفوزیون بایستی چند $\frac{\text{ml}}{\text{hr}}$ بر روی سرنگ پمپ تنظیم گردد؟

۶ (د)

۴/۵ (ج)

۳ (ب)

۱/۵ (الف)

۱۱- بیماری متعاقب ضربه به سر (head trauma) در بخش پذیرش شده است. از نقطه نظر پرستاری، بررسی کدام مورد در اولویت است؟

الف) سطح هوشیاری

ب) نبض و فشار خون بیمار

ج) سرعت و عمق تنفس

د) توانایی حرکت اندام

۱۲- در بیمار مبتلا به میوکاردیت تحت درمان با دیگلوکسین، کنترل کدام گروه از علائم زیر توسط پرستار مهم است؟

الف) دیس ریتمی، آنورکسی، تهوع، استفراغ، سردرد

ب) تغییر فشار خون، سوزن سوزن شدن اندام ها

ج) ضعف و بی حالی، تحریک پذیری، یبوست

د) دیس ریتمی، هیپوکسی، تشنج

۱۳- کدام تشخیص پرستاری در بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری (ACS) صحیح است؟

الف) اضطراب مرگ

ب) ریسک اختلال مایعات

ج) ریسک نارسایی اندام های حیاتی

د) احساس بی قدرتی

۱۴- برای بیمار مبتلا به پنومونی لوب تحتانی چپ، دق و درناژ وضعیتی تجویز شده است. وضعیت مناسب برای انجام این تکنیک کدام است؟

الف) خوابیده به پهلو راست با پاهای بالا

- (ب) نیمه نشسته با زانوهای خمیده
(ج) خوابیده به شکم یا خوابیده متمایل به چپ
(د) تنه خمیده متمایل به جلو
- ۱۵- در مراقبت از بیماری که حین برونکوسکوپی، بیوپسی شده است، بروز کدامیک از یافته های زیر نیاز به گزارش فوری پرستار دارد؟
(الف) سرفه خشک (ب) هماچوری (ج) برونکواسپاسم (د) خلط با رگه های خونی
- ۱۶- بیماری تحت شیمی درمانی با دوکسوروبیسین و ۵- فلوئوراسیل قرار دارد، پرستار کدام مورد زیر را جهت پیشگیری و کنترل استوماتیت به وی آموزش می دهد؟
(الف) شستشوی مداوم دهان با مواد ضدعفونی کننده
(ب) مکیدن یخ سه روز قبل، حین و سه روز پس از شیمی درمانی
(ج) بررسی مخاط دهان هر ۲ ساعت یک بار قبل، حین و پس از شیمی درمانی
(د) رعایت بهداشت دهان و اجتناب از صدمه زدن به مخاط
- ۱۷- به منظور پایش عوارض تزریق خون پس از ترانسفوزیون، کدام مورد زیر باید انجام شود؟
(الف) برقراری خط وریدی همراه با تزریق رینگر لاکتات
(ب) کنترل میزان اشباع اکسیژن خون هر ۲ ساعت
(ج) بررسی نمونه ادرار بیمار از نظر وجود هموگلوبین
(د) تب بالا، اتساع ورید ژیگولار، اضطراب و گیجی
- ۱۸- در مراقبت از بیماران پس از عمل جراحی کاتاراکت، کدام مورد صحیح است؟
(الف) گزارش جرقه زدن یا بروز نقاط نورانی در جلوی چشم
(ب) پوشیدن پد چشمی در سمت جراحی شده به مدت یک هفته
(ج) استفاده از قطره های گشادکننده مردمک به مدت ۶ ساعت
(د) خوابیدن به سمت چشم جراحی شده در شبها
- ۱۹- در موارد احتمال ایجاد سندرم فیزیولوژیک گچ در بیماران با گچ گیری تمام بدن، پرستار باید چه علائمی را پایش و گزارش نماید؟
(الف) صدای روده، نفخ، تهوع، استفراغ
(ب) علائم سایکولوژیک
(ج) علائم حیاتی، نكروز انتهاها
(د) اختلالات تغذیه ای
- ۲۰- مراقبت صحیح هنگام استفاده از جوراب ضد آمبولی بعد از جراحی تعویض مفصل ران، کدام است؟
(الف) در هر شیف ۲۰ دقیقه خارج شود.
(ب) در شبها هنگام خواب خارج گردد.

(ج) به هیچ وجه خارج نشود.

(د) روزانه ۲۰ دقیقه خارج شود.

۲۱- کدامیک از تشخیص های پرستاری زیر در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدیسم صحیح است؟

(الف) تطابق غیر موثر ناشی از اختلالات فرآیند شناختی

(ب) عدم تعادل تغذیه ای کمتر از نیازهای بدن

(ج) عدم تحمل فعالیت ناشی از خستگی مفرط

(د) الگوی غیر موثر تنفس ناشی از کاهش تهویه

۲۲- کدامیک از رویکردهای زیر ارتباط با مددجوی دارای اختلال شنوایی را تسهیل نمی کند؟

(الف) تکرار صحبت

(ب) صحبت با صدای بلند

(ج) استفاده از تغییر حالات چهره

(د) استفاده از روش نوشتاری

۲۳- مددجویی مبتلا به هرپس سیمپلکس تناسلی شده است، کدام گزاره در مورد این عفونت

صحیح است؟

(الف) در دوران حاملگی ممکن است باعث سقط خودبه خودی یا زایمان زودرس شود.

(ب) وزیکول های پر از مایع و بدون درد که طی ۳ تا ۷ روز زخمی شده و بهبود می یابند.

(ج) کراتوکونژونکتویت هرپتیک معمولا دو طرفه است و باعث علائم سیستمیک می شود.

(د) مددجو می تواند تماس جنسی داشته باشد، اما باید از کاندوم استفاده کند.

۲۴- برای مددجویی که اخیرا گرافت پوستی داشته، توصیه پرستار کدام است؟

(الف) از روش های استتار آرایشی استفاده کند.

(ب) گرافت را از نور مستقیم خورشید محافظت کند.

(ج) به فیزیوتراپی اندام ادامه دهد.

(د) در محل گرافت لوسیون نرم کننده بمالد.

کودکان

۲۵- کدامیک از توصیه های تغذیه ای زیر در سن نوپایی به کاهش وزن در بزرگسالی کمک می کند؟

(الف) مصرف روزانه ۱۴ گرم فیبر / ۱۰۰۰ کیلو کالری

(ب) مصرف روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین D

(ج) مصرف روزانه ۴۰۰ سی سی آبمیوه طبیعی تاره

(د) مصرف روزانه ۱ عدد مکمل ویتامین C

۲۶- به منظور کنترل رفتارهای خشونت آمیز فیزیکی و کلامی در کودک خردسال، بهترین

توصیه به والدین کدام است؟

(الف) کنترل نوع و مدت زمان تماشای برنامه های تلویزیونی

- (ب) نشان دادن عصبانیت در هنگام درگیری با کودک دیگر
 (ج) نظارت مستقیم بر بازی و تعامل کودک در پارک
 (د) تشویق و تنبیه کودک مبتنی بر موقعیت

۲۷- در کدام مرحله سنی هویت جنسی خود را درک می کند؟

- الف) نوپایی (ب) خردسالی (ج) نوباوگی (د) نوجوانی

۲۸- مناسب ترین روش برای آموزش دیسیپلین به کودک نوپا کدام است؟

- الف) نادیده گرفتن خطای رفتاری به دلیل سن کم
 (ب) نشستن به مدت کوتاه رو به دیوار و دست به سینه
 (ج) زدن چند ضربه ملایم به پشت دست یا پای کودک
 (د) توضیح درباره رفتار اشتباه کودک

۲۹- مهم ترین معیار برای تشخیص سوء رفتار با کودک کدام است؟

- الف) عدم تطابق بین تاریخچه سلامت و معاینه محل آسیب
 (ب) عقب ماندگی تکامل هوشی و عاطفی
 (ج) خون مردگی های متعدد روی بدن
 (د) بی اختیاری اداری نامتناسب با سن

۳۰- در مراقبت از کودک مبتلا به کونژکتیویت، مهم ترین نکته آموزشی کدام است؟

- الف) پیشگیری از انتقال عفونت به سایر اعضا خانواده
 (ب) جداسازی اتاق کودک از سایر اعضا خانواده
 (ج) استحمام روزانه با آب ولرم
 (د) کمپرس گرم هر سه ساعت

۳۱- ابتلا به بیماری مزمن در کدام دوره سنی منجر به اختلال در فرایند اجتماعی شدن کودک می شود؟

- الف) نوپایی (ب) خردسالی (ج) نوباوگی (د) نوجوانی

۳۲- در آموزش به کودک ۴ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی (ADHD) دلیل تاکید بر رعایت بهداشت دهان و دندان، کدام است؟

- الف) ویژگی بیماری
 (ب) عدم تمرکز کودک
 (ج) داروهای تجویز شده
 (د) سن کودک

۳۳- در هنگام مصاحبه با نوجوان دارای رفتار پرخطر، توجه به کدام نکته اهمیت دارد؟

- الف) انجام مصاحبه بدون حضور والدین
 (ب) توضیح در خصوص عدم امکان رازداری پرستار

(ج) ارائه توصیه بر اساس تجربیات شخصی

(د) شروع مصاحبه با موضوع رفتار پرخطر

۳۴- مراقبت پرستاری در مصرف دیگوکسین برای کودکان و شیرخواران کدام است؟

(الف) محدودیت مصرف مایعات در شیرخوار

(ب) تکرار دوز دارو در صورت استفراغ کودک

(ج) دو برابر کردن دوز بعدی در صورت فراموشی یک دوز

(د) عدم مصرف همزمان دارو با مایعات و غذا

۳۵- مهم ترین نکته در مراقبت در منزل از شیرخوار، بعد از ترمیم منگوسل کدام است؟

(الف) بررسی منظم از لحاظ آسیب پوستی

(ب) تعویض روزانه پانسمان

(ج) اندازه گیری هفتگی دور سر

(د) اندازه گیری روزانه دور شکم

۳۶- رژیم غذایی مناسب برای کودک مبتلا به فنیل کتون اوری متناسب با سطح فنیل آلانین

کدام است؟

(الف) محدودیت مایعات

(ب) مصرف پروتئین

(ج) محدودیت سبزیجات

(د) مصرف لبنیات

۳۷- مقدار مایع نگهدارنده مورد نیاز یک کودک ۱۸ ماهه با وزن ۱۲ کیلوگرم چقدر است؟

(الف) ۱۱۰۰ سی سی (ب) ۱۲۰۰ سی سی (ج) ۱۸۰۰ سی سی (د) ۲۴۰۰ سی سی

۳۸- در کودک تحت رژیم درمانی سلیاک، احتمال بروز کدامیک از اختلالات زیر وجود

دارد؟

(الف) کمبود ویتامین ب ۱۲

(ب) کمبود روی

(ج) آنمی فقر آهن

(د) آنمی داسی شکل

۳۹- در طرح ترخیص کودک بعد از جراحی تانسلیکتومی، کدام نکته باید مد نظر پرستار قرار

گیرد؟

(الف) تشویق کودک به مصرف مایعات گرم

(ب) استفاده از استامینوفن کدئین در صورت درد

(ج) تشویق به سرفه هر ۲ تا ۴ ساعت

(د) توجه به علائم بلع مکرر

۴۰- در سندرم اجوف فوقانی اولین اقدام پرستار کدام است؟

الف) برقراری راه هوایی

ب) قطع جریان مایع

ج) استفاده از کمپرس گرم بر روی موضع

د) پانسمان فشاری بر روی موضع

۴۱- کدام توضیح در خصوص اختلال هموفیلی صحیح است؟

الف) اختلال غالب وابسته به کروموزوم Y

ب) اختلال غالب وابسته به کروموزوم X

ج) اختلال مغلوب وابسته به کروموزوم X

د) اختلال مغلوب وابسته به کروموزوم Y

۴۲- مراقبت پرستاری بعد از بیوپسی کلیه کدام است؟

الف) پوزیشن ترندلنبرگ

ب) استراحت در تخت تا ۲۴ ساعت

ج) کنترل واکنش کودک به ماده حاجب

د) منع مصرف دهانی تا ۲۴ ساعت

۴۳- راه انتقال هیپاتیت A کدام است؟

الف) شیر مادر مبتلا

ب) مصرف غذای آلوده

ج) انتقال خون آلوده

د) تماس با فرد آلوده

۴۴- در طرح ترخیص کودک مبتلا به سندرم نفروتیک، تاکید بر کدام مورد اهمیت دارد؟

الف) ضرورت انجام سالیانه آزمایش ادرار

ب) جلوگیری از تماس نزدیک با کودکان

ج) توجه به علائم عود بیماری

د) عدم انجام واکسیناسیون

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

WWW.NOKHBEGAAN.COM

۴۵- در صورت نشت داروی شیمی درمانی به زیر پوست کودک، اولین اقدام پرستار کدام است؟

الف) قطع جریان دارو

ب) شستشوی رگ با نرمال سالین

ج) تزریق زیر جلدی کورتیکواستروئید

د) استعمال پماد تتراسیکلین ۱ درصد

۴۶- مصرف کدامیک از داروهای زیر برای کودک زیر ۲ سال ممنوع است؟

الف) تئوفیلین ب) کرمولین سدیم ج) تربوتالین د) آلبوترول

۴۷- مهم ترین مراقبت پرستاری در منزل کودک مبتلا به فیبروز کیستیک کدام است؟

الف) مصرف رژیم غذایی پرپروتئین

ب) فیزیوتراپی قفسه سینه

ج) تمیز کردن راه هوایی

د) انجام تست عرق سالیانه

۴۸- باور کودک خردسال نسبت به مرگ کدام است؟

الف) مفهوم کاملی از مرگ دارد.

ب) احساس گناه نسبت به مرگ نزدیکان دارد.

ج) تفکرات او می تواند منجر به مرگ شود.

د) تفاوتی بین مرگ و زندگی قائل نیست.

بهداشت مادران و نوزادان

۴۹- وجود موکوس بنفش - آبی در واژن نشانه چیست؟

الف) علامت قطعی حاملگی

ب) علامت احتمالی حاملگی

ج) نشانه جفت سرراهی

د) نشانه عفونت کلامیدیا

۵۰- کدامیک از تغییرات زیر در دوران حاملگی طبیعی محسوب می شود؟

الف) هیپرتروفی مختصر قلب

ب) افزایش فشار خون

ج) کاهش گلبول های قرمز

د) کاهش گلبول های سفید

۵۱- بهترین زمان بررسی آنومالیهای جنین کدام است؟

الف) ۱۰-۱۷ روز بعد از تشخیص حاملگی

ب) ۱۷-۵۶ روز بعد از تشخیص حاملگی

ج) ۱۰-۱۷ روز بعد از تشخیص صدای قلب

- (د) ۱۷-۵۶ روز بعد از لقاح
- ۵۲- در کدام گروه سنی ماموگرافی سالیانه توصیه می شود؟
 الف) زیر ۴۰ سال (ب) ۴۰ تا ۵۰ سال (ج) ۵۰ تا ۷۴ سال (د) بالای ۷۵ سال
- ۵۳- موثرترین روش کاهش درد در هنگام زایمان کدام است؟
 الف) نالوکسان (ب) مرفین (ج) بی حسی اپیدورال (د) بیهوشی عمومی
- ۵۴- در مراقبت از قربانی تجاوز جنسی، کدام اقدام پرستار در اولویت است؟
 الف) ارائه حمایت عاطفی و ارتباط حمایتی
 ب) ارزیابی فوری وضعیت عاطفی و آسیب های جسمی
 ج) اطمینان از حفظ «زنجیره نگهداری شواهد»
 د) جمع آوری نمونه مو، سواب بزاق و سوهان زیر ناخن
- ۵۵- تاریخ تخمینی زایمان خانمی با قاعدگی منظم ۲۸ روزه که اولین روز آخرین قاعدگی اش اول فروردین ۱۴۰۱ می باشد، کدام است؟
 الف) ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
 ب) ۷ دی ماه ۱۴۰۱
 ج) ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱
 د) ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱
- ۵۶- اولویت اول مراقبت پرستاری در استفراغ حاملگی کدام است؟
 الف) توصیه به مصرف مواد پر فیبر
 ب) تعیین شدت مشکل
 ج) بررسی علائم حیاتی
 د) توصیه به مصرف مواد کم کربوهیدرات
- ۵۷- ابتلا به کدام ویروس زیر در مادر بیشترین خطر را برای نوزاد و جنین دارد؟
 الف) پاپیلوماوی انسانی
 ب) هپاتیت B
 ج) هپاتیت C
 د) هرپس تناسلی
- ۵۸- کدامیک از موارد زیر در پیشگیری از پره اکلامپسی تاثیر ندارد؟
 الف) محدودیت مصرف سدیم
 ب) درمان بیماریهای لته
 ج) درمان عفونت های ادراری
 د) مدیریت وزن
- ۵۹- مهم ترین مراقبت پرستاری در حین استفاده از فورسپس برای زایمان کدام است؟

الف) بررسی واژن از لحاظ کبودی و پارگی

ب) کنترل ضربان قلب جنین

ج) بررسی عصب صورتی نوزاد

د) بررسی هماتوم ساب دورال

۶۰- به منظور تسکین درد ناشی از تجمع گاز بعد از سزارین کدام اقدام صحیح است؟

الف). مصرف شیر کامل

ب) فشار ناحیه شکمی با بالش

ج) قرار گرفتن به پهلو چپ

د) استفاده از نی برای مصرف مایعات

۶۱- بهترین پوزیشن بلافاصله بعد از تشخیص پرولاپس بند ناف کدام است؟

الف) Trendelenburg (ب) Prone (ج) Lithotomy (د) Sniff

۶۲- کدام نوع از کیست های تخمدانی در ۵۰ درصد از موارد با مول هیداتی فرم همراه هستند؟

الف) Follicular

ب) Corpus Luteum

ج) Theca-Lutein

د) Polycystic ovary syndrom

۶۳- کدام مراقبت پرستاری بعد از هیسترکتومی واژینال صحیح است؟

الف) خارج کردن سوند فولی حداکثر ۴ ساعت بعد از عمل

ب) استفاده از کیسه آبگرم جهت تسکین درد ناحیه پرینه

ج) ارزیابی علائم هومانس در بیمار

د) تمرینات روزانه ورزشی پاها

۶۴- پرستار برای حفاظت از خود هنگام مراقبت از بیمار تحت رادیوتراپی داخلی رحم، ملزم به

رعایت کدام مورد است؟

الف) محدودیت تماس با بیمار حداکثر ۲ ساعت در شیفت

ب) لزوم استفاده از پیشند سربی در حین شیفت

ج) پوشیدن دستکش و گان در حین شیفت

د) برداشتن ایمپلنت رادیواکتیو با فورسپس سربی

۶۵- کدام شاخص نشان دهنده خطر مشکلات تغذیه ای در دوران بارداری است؟

الف) حاملگی مکرر با سابقه سه بار بارداری در عرض ۲ سال

ب) وزن گیری کمتر از ۱ کیلوگرم در ماه، در سه ماهه اول بارداری

ج) وزن گیری بیش از ۲ کیلوگرم در ماه، بعد از سه ماهه اول بارداری

د) بالا بودن مقدار هموگلوبین و هماتوکریت

۶۶- در زنان بارداری با پیکای شدید به نشاسته ذرت، کدام عارضه مشاهده می شود؟

الف) تولد نوزاد کم وزن

ب) دیابت بارداری

ج) افزایش هموگلوبین

د) افزایش جذب کلسیم

۶۷- آموزش انجام نحوه صحیح بهداشت ناحیه پرینه به مددجویی با بیماری منتقله از طریق

جنسی، در راستای کدام تشخیص پرستاری زیر است؟

الف) حفظ ناکافی سلامتی

ب) اشکال در تعامل اجتماعی

ج) اختلال در تمامیت بافتی

د) اضطراب در رابطه با ابتلا به بیماری

۶۸- کدامیک از موارد زیر، از عوامل شیمیایی موثر برای شروع تنفس نوزاد تازه متولد شده

است؟

الف) کلامپ بند ناف نوزاد

ب) خشک و گرم کردن نوزاد

ج) افزایش فشار قفسه سینه حین زایمان

د) ساکشن مجاری هوایی و دهان نوزاد

۶۹- کدام مراقبت پرستاری زیر در اتاق زایمان در اولویت قرار دارد؟

الف) برقراری هرچه سریعتر تماس پوستی و چشمی با مادر

ب) تشویق مادر به شروع هر چه سریع تر شیردهی به نوزاد

ج) خشک کردن و پاک کردن ورنیکس از روی پوست نوزاد

د) تامین محیط حرارتی خنثی برای نوزاد تازه متولد شده

۷۰- استفاده از کدام دارو در نوزادان متولد شده از مادر معتاد به نارکوتیک، کنتراندیکاسیون دارد؟

الف) مرفین ب) نالوکسان ج) فنوباریتال د) تئوفیلین

۷۱- هدف اصلی مراقبت پرستاری از نوزادان آسیب پذیر بستری، کدامیک از موارد زیر است؟

الف) ارتقاء رشد و تکامل با ایجاد محیطی شبیه به داخل رحم

ب) حفظ درجه حرارت با ایجاد محیطی شبیه به داخل رحم

ج) پیشگیری از مشکلات تنفسی

د) پیشگیری از مشکلات تغذیه ای

۷۲- تبدیل کلاستروم به شیر کامل در چه زمانی بعد از تولد نوزاد اتفاق می افتد؟

الف) ۸-۱۲ ساعت ب) ۲۴-۴۸ ساعت ج) ۴۸-۷۲ ساعت د) ۷۲-۹۶ ساعت

بهداشت جامعه

۷۳- ارائه مراقبت به مددجو و خانواده در محل زندگی، محل کار یا مدرسه معرف کدام رویکرد پرستاری سلامت جامعه است؟

الف) Community based nursing

ب) Community nursing

ج) Family health nursing

د) Family practice

۷۴- کدام گزینه از عملکردهای اصلی پرستار سلامت جامعه است؟

الف) بررسی و شناخت وضعیت سلامت افراد جامعه

ب) توسعه سیاست های مربوط به حمایت از مصرف کننده

ج) بیمه گری و توسعه خدمات بیمه افراد تحت پوشش

د) مدیریت مراکز و برنامه های بخش بهداشت

۷۵- قوانین نامکتوب در گروه که موجب حرکت اعضا در جهت اهداف، تثبیت گروه و اطمینان از

درک و تفسیر صحیح حقایق می شود کدام است؟

الف) همبستگی (ب) پویایی (ج) هنجار (د) بقا

۷۶- اجرای برنامه پیاده روی برای بهبود رفتارهای بهداشتی مرتبط با سبک زندگی مردم، کدام

سطح پیشگیری است؟

الف) جمعیتی (ب) اولیه (ج) ثانویه (د) ثالثیه

۷۷- مبنای برآورد شاخص DA کدام است؟

الف) سال های عمر توأم با ناتوانی و میزان مرگ و میر اختصاصی

ب) سال های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس و امید به زندگی

ج) میزان مرگ و میر خام، میزان تولد زنده و میزان ناتوانی اختصاصی

د) مدت زمان زندگی با ناتوانی و زمان از دست رفته به علت مرگ زود هنگام

۷۸- بهترین روش برای ارزیابی اقتصادی بودن مداخلات بهداشتی، محاسبه کدام شاخص است؟

الف) تولید ناخالص ملی

ب) تولید خالص ملی

ج) تحلیل هزینه فایده

د) تولید ناخالص داخلی

۷۹- استفاده از کدهای اخلاق جهت هدایت عملکرد پرستاری، کدام سطح پیشگیری است؟

الف) اساسی (ب) اولیه (ج) ثانویه (د) ثالثیه

۸۰- کدامیک از عبارات زیر در مورد مدل مداخله چرخ (صحیح است؟)

الف) این مدل مددجو بیمار محور است.

ب) شامل دو سطح عملکرد فردی و خانوادگی است.

(ج) مداخلات از سه عامل متفاوت با ارزش مساوی تشکیل شده اند.
(د) مداخلات این مدل شامل ۸ مداخله مراقبت بهداشتی اولیه است.

۸۱- مشاهده مستقیم بیمار مبتلا به سل فعال در هنگام مصرف دارو، جهت اطمینان از رعایت رژیم دارویی، در کدام سطح پیشگیری قرار می گیرد؟

الف) اول (ب) دوم (ج) سوم (د) چهارم

۸۲- ارگانوفسفاتها جزء کدام دسته از عوامل شیمیایی دسته بندی می شوند؟

الف) ترکیبات فلزی (ب) هیدروکربنها (ج) گازهای محرک (د) آفت کش ها

۸۳- بهترین نشانگرهای وضع کلی آلاینده‌گی هوا کدام است؟

الف) دی اکسید گوگرد، دود و ذرات معلق

(ب) نیتراکسها، سرب، ازن لایه بالایی جو

(ج) مونوکسید گوگرد، ازن، گاز رادن

(د) ذرات معلق، هیدروکربنات ها و نیتريت

۸۴- سالمونلا از طریق مصرف کدام ماده غذایی به انسان انتقال می یابد؟

الف) گوشت سفید و قرمز

(ب) تخم مرغ خام یا نیم پز

(ج) سبزیجات و میوه جات

(د) شیر و مواد لبنی

۸۵- حد مطمئن فلوتور در یک لیتر آب آشامیدنی کدام است؟

الف) ۰/۵ تا ۰/۸ میلی گرم

(ب) ۱ تا ۵ میلی گرم

(ج) ۰/۵ تا ۳ گرم

(د) ۰/۵ تا ۱/۵ گرم

۸۶- علت تجمع بیشتر مواد شیمیایی سمی در کودکان نسبت به بزرگسالان کدام است؟

الف) تکامل ناقص جدار روده کودکان نسبت به بزرگسالان

(ب) مصرف بیشتر مایعات و میوه جات توسط بزرگسالان

(ج) ناتوانی کلیه کودکان در فیلتراسیون کافی سموم

(د) بیشتر بودن نسبت وزن به سطح بدن در بزرگسالان

۸۷- مهم ترین و متداول ترین روش تعیین درجه آلودگی فاضلاب شهری کدام است؟

الف) COD (ب) TOC (ج) BOD (د) SS

۸۸- بیماری های تابشی جزء کدامیک از اثرات پرتوهای زیان بار است؟

الف) جسمی فوری (ب) جسمی دیررس (ج) ژنتیکی فوری (د) ژنتیکی دیررس

۸۹- حداقل مدت زمان برای ساخت مسکن در زمین هایی که به روش خاک ریزی دستی هموار شده اند، چند سال است؟

الف) ۱-۵ (ب) ۵-۱۰ (ج) ۱۵-۲۰ (د) ۲۰-۲۵

۹۰- عامل انتقال بیماری خواب به انسان کدام است؟

الف) پشه خاکی (ب) مگس تسه تسه (ج) شپش (د) کنه

۹۱- مهم ترین ناپهنجاری شناخته شده ناشی از کمبود مس در بدن کدام است؟

الف) سیروز (ب) بیماری هوچکین (ج) نوتروپنی (د) پرکاری تیروئید

۹۲- برای پاستوریزه کردن شیر در مقادیر کم و در جوامع روستایی کدام روش توصیه می شود؟

الف) Boiling (ب) Holder (ج) HTST (د) UHT

۹۳- نقش فردی که در گروه تلاش می کند اختلافات بین اعضا را کاهش دهد، کدام است؟

الف) پیرو (ب) دروازه بان (ج) صلح ساز (د) پیشرو

۹۴- اقدامات بهداشتی جهت پایش قند خون، کنترل مصرف مرتب داروها، حفظ رژیم و انجام

منظم ورزش در بیمار مبتلا به دیابت، مربوط به کدام سطح پیشگیری است؟

الف) جمعیتی (ب) اول (ج) دوم (د) سوم

۹۵- کدام عامل در تعیین وضعیت سلامت جامعه سهم بیشتری دارد؟

الف) عوامل زیستی و وراثتی

ب) رفتارها و عادات بهداشتی

ج) مراکز ارائه خدمات بهداشتی

د) ویژگی های اجتماعی

۹۶- درمان اصلی واکنش آنافیلاکسی به واکسن کدام است؟

الف) پوشاندن بدن بیمار با پتو و بالا بردن پاها

ب) تجویز آنتی هیستامین و گشادکننده راه هوایی

ج) گرفتن رگ و شروع مایع درمانی برای بیمار

د) تزریق اپی نفرین داخل عضلانی یک در هزار

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناس ارشد

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

WWW.NOKHBEGAAN.COM

روان پرستاری

۹۷- بیماری با کوچک ترین مسئله تحریک شده و به پرخاشگری می پردازد. شما به عنوان روان پرستار مشکل بیمار را نشانه ی کدام اختلال می دانید؟

الف) اختلال در محتوای تفکر

ب) اختلال در ادراک

ج) عدم کنترل تکانه

د) بینش مختل

۹۸- بر اساس مدل استرس و سازگاری سلیه، استراتژی های مقابله ای در کدام

مرحله از پاسخ به استرس اثرگذار است؟

الف) ارزیابی شناختی اولیه

ب) ارزیابی شناختی ثانویه

ج) کیفیت پاسخ به استرس

د) عوامل تسریع کننده

۹۹- یکی از تظاهرات مهم افسردگی در سالمندان، شکایت های متعدد جسمانی در آنان است.

این علامت نشانه ی کدام مکانیسم دفاعی است؟

الف) جسمی سازی

ب) درونی سازی

ج) وارونه سازی

د) جابه جایی

۱۰۰- کدام یک از موارد زیر بیانگر اعتماد به نفس بالا است؟

الف) واکنش هیجانی

ب) ثبات عاطفی

ج) احساس بزرگ بینی

د) درون گرایی

۱۰۱- برای درمان افکار منفی بیمار مبتلا به افسردگی، کدام تکنیک زیر در روش شناخت درمانی

برای درمان استفاده نمی شود؟

الف) طراحی یک تکلیف بازاندیشی

ب) طراحی یک سناریوی موقعیتی

ج) حساسیت زدایی تدریجی

د) گفت و گو درمانی

۱۰۲- روان پرستار برای تقویت بهداشت فردی بیمار، به او قول می دهد بعد از هر بار حمام بتواند

با خانواده خود تلفنی صحبت کند. این روش مطابق با کدامیک از رویکردهای روانشناختی است؟

- الف) رفتار درمانی - روش پریماک
 ب) شناخت درمانی - روش بک
 ج) رفتار درمانی - اقتصاد پتهای
 د) شناخت درمانی - روش آلیس

۱۰۳- بیمار دارای اختلال روان، به خونریزی های خود به خودی از بینی مبتلا می گردد. تشخیص شما چیست و مربوط به کدام دارو است؟

- الف) مسمومیت لیتیم
 ب) عوارض اکسترا پیرامیدال - پرفنازین
 ج) دیسکرازی - والپروات سدیم
 د) آگرانولوسیتوز - فلوکستین

۱۰۴- بیمار به پرستار می گوید: «پلیس برای کشتن من فرستاده شده اند». بهترین پاسخ پرستار به این نگرانی بیمار چیست؟

- الف) مگر چکار کردید که می خواهند شما را بکشند؟
 ب) اینجا پلیس وجود ندارد، نگران نباشید.
 ج) از این که افرادی قصد آسیب به شما را دارند، نگران هستید؟
 د) چرا فکر می کنید که پلیس برای کشتن شما فرستاده شده اند؟

۱۰۵- بیماری مبتلا به دلیریوم در شب دچار گیجی و از دست دادن قدرت جهت یابی می شود. پرستار چه مداخله ای بایستی انجام دهد؟

- الف) بیمار را به نزدیک ایستگاه پرستاری منتقل کند.
 ب) از نور غیر مستقیم در طول شب استفاده کند.
 ج) لامپ ها را در تمام شب روشن نگه دارد.
 د) اتاق بیمار را با نور کافی همراه با یک موسیقی آرام نگه دارد.

۱۰۶- بیماری با تشخیص افسردگی در بخش بستری شده است. مداخله مناسب در روزهای اول کدام است؟

- الف) تشویق بیمار به خواندن و نوشتن آرام
 ب) ایجاد امکان انجام فعالیت های مناسب ورزشی
 ج) عدم درگیری بیمار در فعالیتهای اجتماعی تا زمان درخواست او
 د) ایجاد ایمنی برای بیمار و دیگران

۱۰۷- بیماری ۲۴ ساعت قبل به علت شکستگی سر استخوان ران در بخش پذیرش شده است. کدامیک از موارد زیر احتمال دلیریوم ناشی از محرومیت از الکل را در این بیمار نشان می دهد؟

- الف) افت فشار خون، آتاکسی، گرسنگی
 ب) استوپور، لتارژی، سفتی عضلانی

(ج) افت فشار خون، لرزش های واضح دست، لتارژی

(د) بیقراری، تغییر در سطح هوشیاری، توهم

۱۰۸ - بیماری پس از تلاش برای خودکشی با آویزان کردن خود با طناب، در بخش بستری شده

است. بهترین راه برای این که پرستار از تامین امنیت بیمار مطمئن گردد، کدام است؟

(الف) درخواست از یک بیمار دیگر برای ماندن کنار بیمار در همه ی زمانها

(ب) در آوردن لباس های بیمار و پوشاندن لباس بیمارستان

(ج) اختصاص یک همکار برای نظارت بر بیمار در همهی اوقات

(د) قرار دادن بیمار در اتاق ایزوله عاری از خطر

۱۰۹ - بیمار پس از یک ماه مصرف بوسپیرون برای معاینه به درمانگاه مراجعه کرده است. در

صورت کاهش کدام علامت، دارو موثر بوده است؟

(الف) افکار پارانوئید (ب) اضطراب (ج) پرش افکار (د) هذیان

۱۱۰ - بیمار مبتلا به بی اشتهایی عصبی در حال ترخیص از بیمارستان، مدعی است که در طی

مدت بستری لباسهایش تنگ شده و باید وزن خود را کاهش دهد. ارزیابی شما از این رفتار بیمار

چیست؟

(الف) احساس تردید بیمار برای ترخیص

(ب) ایجاد اختلال در تصویر بدنی بیمار

(ج) تشدید بی اشتهایی عصبی بیمار

(د) رفتار طبیعی است و عدم نیاز به کاهش وزن

۱۱۱ - بیمار مبتلا به مانیک در زمان ملاقات، رفتارهای جنسی انجام می دهد و پس از تذکر پرستار

در مورد نامناسب بودن این رفتار، شروع به توهین کلامی و پرخاشگری می کند. بر اساس تحلیل

موقعیت، مداخله مناسب کدام است؟

(الف) قرار دادن بیمار در اتاق انفرادی به مدت ۳۰ دقیقه

(ب) تذکر به بیمار در مورد رفتار نامناسب او

(ج) بردن بیمار به اتاقش با مشارکت همکاران دیگر

(د) محرومیت بیمار از تماس تلفنی به مدت ۲۴ ساعت

۱۱۲ - حواس پرتی، گیجی، گوشه گیری و خشم در مددجوی قربانی تجاوز، نشانهی کدام مورد

است؟

(الف) افسردگی

(ب) حالت تدافعی

(ج) خطر خودکشی

(د) واکنش به رویداد

۱۱۳- بیماری از ترس مسخره شدن توسط دیگران، در مهمانی‌ها شرکت نمی‌کند. به نظر شما این بیمار احتمالاً مبتلا به کدام اختلال شخصیتی زیر است؟

الف) اجتنابی ب) اسکیزوئید ج) وسواسی د) وابسته

۱۱۴- بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا در حال ترخیص با داروی رisperidon ۲ میلی گرم روزانه است. آموزش قبل از ترخیص در این بیمار کدام است؟

الف) نور خورشید کافی دریافت کند.

ب) می‌تواند بدون نگرانی رانندگی کند.

ج) از غذاهای پرپتاسیم پرهیز کند.

د) در هنگام تغییر پوزیشن، به آرامی از جا برخیزد.

۱۱۵- رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی در کدام مرحله از ابتلا به اسکیزوفرنیا بروز پیدا می‌کند؟

الف) Premorbid phase

ب) Residual phase

ج) Active psychotic phase

د) Prodromal phase

۱۱۶- برای کمک به بیمار مبتلا به وسواس فکری- جبری، کدامیک از موارد زیر، روش بازداری متقابل است؟

الف) آموزش تکنیک‌های آرام سازی

ب) آموزش توقف افکار منفی و اتوماتیک

ج) آموزش غرقه سازی

د) انجام روان درمانی حمایتی فردی

۱۱۷- به مادر کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی توصیه می‌کنید که اهداف کوتاه مدت را برای کاهش خشم کودک در سن مدرسه برنامه ریزی کند. دلیل انجام این مداخله چیست؟

الف) اعتماد به نفس پایین

ب) عدم توانایی کنترل تکانه

ج) عدم تحمل سرخوردگی

د) دامنه تمرکز کم

۱۱۸- در خصوص DD D در کودکان کدام گزینه نادرست است؟

الف) کودک دارای رفتارهای منفعل پرخاشگر است.

ب) رفتارهای لجبازی نسبت به والدین بروز پیدا می‌کند.

ج) کودک علت لجبازی را خواسته‌های غیر منطقی دیگران تلقی می‌کند.

د) منفی کاری نشانه اصلی این اختلال است.

۱۱۹- اختلال در قضاوت اجتماعی، مربوط به کدام قسمت مغز است؟

الف) هیپوتالاموس

ب) آمیگدال

ج) کورتکس فرونتال و پره فرونتال

د) ساختارهای لیمبیک

۱۲۰- بیمار با تشخیص اضطراب مزمن در حال ترخیص است. کدام روش مراقبتی توصیه می شود؟

الف) پس زدن احساسات اضطراب بیمار

ب) شناسایی موقعیت های ایجاد کننده اضطراب

ج) ادامه مشاوره روان درمانی پس از ترخیص

د) حذف موقعیت های اضطراب آور

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱-۶۶۹۰۲۰۳۸-۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶

WWW.NOKHBEGAAN.COM

آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه پرستاری

سال ۲۰۱

زبان عمومی

■ **D**

- **A**

a) chronic b) hereditary c) congenital d) contagious

- on his forehead after he bumped into the d

a) debris b) buffer c) bruise d) decay

-

a) potentiated b) revitalized c) debilitated d) provoked

-

a) condensation b) consensus c) concession d) confession

-

a) equilibrium b) disintegration c) conservation d) decomposition

-

a) stimulation b) discrimination c) hallucination d) defensiveness

-

a) remittance b) incidence c) redundancy d) potency

- **The** of the snakebite victim's health shows that she has not received the proper

a) provision b) deterioration c) inflammation d) fortification

-

a) rewarding b) lucrative c) detrimental d) advantageous

- **When her pain didn't** ,

a) recur b) ascend c) persist d) subside

۱۷

آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه پرستاری

سال ۱۴۰۱

- A
.....
a) intake b) inrush c) upshot d) upturn

-
.....
a) converted b) attenuated c) exacerbated d) inverted

-
.....
a) inadvertent b) unrestrained c) incompetent d) unsound

- D
..... ions, the nurses' motivation is ; they usually give
a) disclosed b) dissipated c) amplified d) augmented

- Because of medical costs, some people avoid regular check
a) soaring b) deflating c) diminishing d) soaking

-
.....
a) collide with b) diverge from c) assimilate into d) clash with

- The drivers' traffic regulations is one of the factors leading to deadly accidents.
a) commitment to b) adherence to c) inheritance of d) violation of

-
..... goals in your mind that are not easy to ; these are just idealistic rather
a) scatter b) attain c) diminish d) intimidate

- A
..... points about the mechanisms of the nervous system.
a) deliberate b) ubiquitous c) obscure d) notorious

- Some small clicking, bubbling, or rattling sounds become in the lungs when a person
a) laudable b) audible c) viable d) feasible

۱۸

سال ۱۴۰۱ | مجموعه پرستاری | آزمون کارشناسی ارشد

D

Mortality data can help focus activities and resource allocation among sectors such as transportation, food, agriculture, and the environment as well as health. COVID-19 has highlighted the importance for countries to invest in civil registration and vital statistics systems to allow daily counting of deaths, and direct prevention and treatment efforts. It has also revealed inherent fragmentation in data collection systems in most low-income countries, where policy-makers still do not know with confidence how many people die and of what causes. To address critical gap, WHO has partnered with global actors to launch “Revealing the Toll of COVID-19: Technical Package for Rapid Mortality Surveillance and Epidemic Response”. By providing the tools and guidance for rapid mortality surveillance, countries can collect data on total number of deaths by day, week, sex, age and location, thus enabling health leaders to trigger more timely efforts for the improvement of health. Furthermore, WHO develops standards and best practices for data collection, processing, and synthesis through the consolidated and improved ‘International Classification of Diseases’ (ICD-11) – a digital platform that facilitates reporting of timely and accurate data for causes of death for countries to routinely generate and use health information that conforms to international standards.

—

a) mortality data measurement
b) health systems effectiveness
c) health systems resource allocation
d) health activities in different sectors

— **A** **D 19** has

a) improved confidence in policy makers in treatment efforts
b) revealed the stable health infrastructure in countries
c) helped the discovery of the causes of deaths in low-income countries
d) contributed to the improvement of vital statistics systems

— **The underlined word “ ” refers to the problems with.....**

a) prevention and treatment efforts
b) fragmented low-income countries
c) health statistics systems
d) policy-makers’ confidence

— **The purpose of the recent WHO initiative global actors is to.....**

a) reveal the causes of COVID-19
b) monitor countries in terms of COVID-19 infection
c) keep a detailed record of COVID-19 mortalities
d) isolate COVID-19 data in terms of sex, age, and location

— **D** **D 11)**

a) includes health information generation and use of the causes of death
b) consolidates the international causes of death around the world
c) is based on the national standards of countries
d) is a platform for controlling the causes of the COVID-19 disease

سال ۱۴۰۱	مجموعه پرستاری	آزمون کارشناسی ارشد
----------	----------------	---------------------

In health forums, one frequently hears government authorities stating that "Brazil is not a poor country, it is an unjust one". Although this acknowledgement is a positive fact, dealing with this situation is still far from satisfactory. The truth is that actions are marked by what one could describe as timidity on behalf of our governors and health officials.

Recognition by the government that this is an unjust country points to the need to articulate the question of poverty with that of social inequality and poor health infrastructure. This means that the question of overcoming poverty and potential health issues should be associated with measures for redistribution, either by direct transfer of income, or indirectly, through social policies and health measures.

However, a series of obstacles are hindering the pursuance of this objective. The first of these concerns the structural adjustment and health economic stability model adopted, known as passive adjustment, with promotion of what could be called a "dictatorship of the economists". Decisive questions for Brazilian society are monopolized by health economic policies. This sets the scene for the practice -along with the preaching- of the well-known antinomy between health economic development and social development that must urgently be overcome.

- Brazil is described as an example of countries

- with positive facts on combating poverty
- demonstrating success in removing injustice
- suffering from inequity in wealth distribution
- with authorities determined to remove injustice

- The underlined term "this acknowledgement" refers to

- positive fact
- what one hears
- Brazil, an example of a poor but a just country
- Brazil being a rich but an unjust country

- The second paragraph mainly

- contradicts redistribution of income
- attributes poverty to social inequity
- suggests direct transfer of government income to the poor
- gives evidence on the transfer of income through social policies

- The "structural adjustment and economic stability model" to combat poverty by

- seek support from the political dictatorship
- have successfully been adopted
- are the writers' suggestions
- could serve as a barrier

- A solution to remove poverty and achieve equity is to economic development and social

- get rid of the contradiction between
- overlook the existing status of
- underestimate the significance of
- continue preaching in favor of existing

۲۰

آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه پرستاری

سال ۱۴۰۱

Everyone knows what a health service is, but ideas about what public health is are more blurred. The public is confused about public health and uncertain what it means in practice. In the UK, they might associate public health with cleanliness, sanitation, environmental health, inspection of housing, or of food outlets. Professionals working in the public health field would see it differently—but they would not agree among themselves either. They might see it as something called 'health promotion' or as activities called 'social marketing'. In the United States or in Southern or Northern Europe, the focus would be different. The public health traditions in these countries vary in line with their different histories. For example, in the United States, claims on public health issues in courts are common, but state involvement is less so, while some Scandinavian countries have a tradition of state involvement or even state ownership of industries (e.g., alcohol) which are connected with public health.

– The definition of public health is worldwide.

a) unified
b) vague
c) explicit
d) conclusive

– _____

a) food markets
b) hygiene
c) health promotion
d) environment

– The writer has mentioned "Scandinavian countries" as an example of public health .

a) government engagement in
b) state's claims on
c) professionals' engagement in
d) people's claims on

– According to the passage, the public and the professionals.....

a) coordinate the development of public health
b) have similar views about health definition
c) have different perceptions on public health
d) acknowledge governments' ownership of health

– A _____

a) Scandinavian countries are controlling alcoholism.
b) A country's public health and history are connected.
c) Legal actions against health is uncommon in the US.
d) Scandinavian governments restrict public health industries.

۲۱

سال ۱۴۰۱

مجموعه پرستاری

آزمون کارشناسی ارشد

An infodemic is primarily concerned with the distribution of much information including false or misleading information in digital and physical environments during a disease outbreak. It causes confusion and risk-taking activities that can harm health. It also leads to mistrust in health authorities and undermines the public health response. An infodemic can intensify or lengthen outbreaks when people are unsure about what they need to do to protect their health and the health of people around them. With growing digitization – an expansion of social media and Internet use – information can spread more rapidly. This can help to more quickly fill information voids but can also amplify harmful messages. Infodemic management is the systematic use of risk and evidence-based analysis and approaches to reduce the impact of infodemics on health behaviors during health emergencies. Infodemic management aims to enable good health practices through four types of activities: _____ and questions, promoting understanding of risk and health expert advice, engaging and empowering communities to take positive action and building resilience to misinformation. Indeed, we substantially need an interdisciplinary approach involving epidemiologists, data scientists, physicists and mathematicians, risk communication practitioners, behavioral scientists, public health professionals, representatives of affected communities, and ideally leading data providers' support.

- A _____ with during epidemics.

a) mistrust in health services
b) risk-taking behaviors of the people
c) spread of abundant information
d) weak public health responses

- According to the text, social media

a) can intensify public health responses
b) may prolong epidemics via infodemics
c) are responsible for the public mistrust
d) were developed to prevent information voids

- A _____

a) behavioral
b) public health
c) risk communication
d) community development

- _____ based analysis is used to in emergencies.

a) fill the information void
b) protect health behaviors
c) empower data providers
d) expand social media

- The writer mentions "listening to community concerns" (line 13) for

a) handling infodemics
b) improving expert advice
c) supporting data providers
d) controlling outbreaks

موفق باشید

۲۲