

سوال ۱۱۱ - روش ترجیحی نگهداری اصلاحات انجام شده پس از مانیپولاسیون در کلاب فوت کدام است؟
الف) Plaster of paris (ب) Dennis brown splint (ج) Adhesive tapping (د) Operative treatment

سوال ۱۱۲ - شایعترین ناحیه درگیری اسپاینایفیدا در ستون فقرات کدام ناحیه است؟
الف) ساکروم (ب) لومبار (ج) توراکولومبار (د) توراسیک

سوال ۱۱۳ - کدام یک از بیماری های زیر را سندرم کلیپل فایل گویند؟
الف) کوتاهی مادر زادی گردن

- (ب) بالا بودن مادرزادی استخوان اسکاپولا
(ج) کلاپس مهره های سرویکال ناشی از عدم جریان خون
(د) انقباض و کوتاهی عضله استرنوکلایدوماستوئید

سوال ۱۱۴ - شایعترین شکستگی که موجب کنتراکچر ایسکمیک ولکمن می شود کدام است؟

- الف) شکستگی سوپراکوندیلر استخوان هومروس همراه با جابجایی
ب) شکستگی تنه استخوان هومروس با عدم جابجایی
ج) شکستگی سوپراکوندیلر هومروس با عدم جابجایی
د) شکستگی تنه استخوان هومروس همراه با جابجایی

سوال ۱۱۵ - ویژگی های بیماری استئوکندریت استخوان لونیت شبیه کدام بیماری می باشد؟

- الف) پرتس (ب) کوهرل (ج) D.D.H (د) استئوآرتریت مفصل هیپ

سوال ۱۱۶ - شایعترین منطقه درگیری در بیماری کنتراکچر دوپئترین کجاست؟

- الف) کف دست (ب) انگشت حلقه (ج) مفاصل MP (د) مفاصل PIP

سوال ۱۱۷ - با ارزش ترین تست تشخیصی درفتگی مادرزادی هیپ در چند روز اول بعد از تولد کدام است؟

- الف) رادیوگرافی لگن
ب) محدودیت شدید حرکت ابداکشن هیپ
ج) تست ارتولانی و بارلو
د) وجود حرکت تلسکوپی در معاینه کلینیکی

سوال ۱۱۸ - درمان بیماری pellegrini-stieda چیست؟

- الف) حرکات فعال و ورزش های تقویت کننده عضله
ب) استفاده از بریس به مدت سه هفته
ج) جراحی
د) نیاز به درمان ندارد

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پوشکی فرهنگ گستر نخبگان
دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کاردانی به کارشناسی
مجموعه زیست شناسی

زیر نظر دکتر دعایی