

سوال ۷- برای بیمار Postpolio جهت تجویز KAFO، در چه صورتی از مفصل زانوی Ring-lock استفاده نمی شود؟

- الف) Severe quadriceps weakness  
ب) Knee hyperextension  
ج) Severe gluteus maximus weakness  
د) Knee buckling

سوال ۸- برای یک نوزاد ۱۴ ماهه با تشخیص Anterolateral bowing، هدف از تجویز ارتز پیشگیری از کدام مورد است؟

- الف) Nonunion fracture  
ب) بدتر شدن دفورمیتی  
ج) درگیری مفاصل پروگزیمال  
د) قطع عصب پروننال

سوال ۹- در اندام فوقانی همه موارد ذیل از اهداف تجویز SEWO می باشد، بجز:

- الف) کاهش درد      ب) پیشگیری از کانترکچر      ج) اصلاح دفورمیتی      د) بهبود حس عمقی

سوال ۱۰- کدام مورد در خصوص Barton wedge صحیح می باشد؟

- الف) Mid foot را کنترل می کند و تا قدام متاتارسها امتداد می یابد.  
ب) Mid foot را کنترل می کند و تا قدام کوبوئید امتداد می یابد.  
ج) Fore foot را کنترل می کند و تا قدام متاتارسها امتداد می یابد.  
د) Fore foot را کنترل می کند و تا قدام کوبوئید امتداد می یابد.

سوال ۱۱- در بیماری با درد مزمن ناشی از Facet syndrome پوزیشن مناسب مهره های کمری در درون ارتز چیست؟

- الف) Neutral      ب) Flexion      ج) Extension      د) Hyper Extension

سوال ۱۲- جهت برداشتن فشار از روی قاعده متاتارس پنجم در یک فرد مبتلا به cavus foot کدام مداخله پیشنهاد می گردد؟

- الف) Mild heel rocker      ب) Double rocker sole      ج) Toe only rocker sole      د) Mild heel to toe rocker

سوال ۱۳- مداخله ارتزی مناسب در بیماری با استئو آرتريت سمت داخل زانو کدام مورد می باشد و مکانیسم عملکرد

آن از طریق کاهش کدام گشتاور زانو است؟

- الف) والگوس بریس - گشتاور والگوسی  
ب) واروس بریس - گشتاور واروسی  
ج) والگوس بریس - گشتاور واروسی  
د) واروس بریس - گشتاور والگوس

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نجفگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کاردانی به کارشناسی

مجموعه زیست شناسی

زیر نظر دکتر دعایی

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱

۰۱۳۱-۳۲۳۸۰۰۲