

سوال ۴۲ - کدام گزینه از شکایات بیماران دچار اختلال عملکرد Contrast Sensitivity می‌باشد؟

- (الف) حرکت حروف در صفحه کتاب
- (ب) عدم توانایی شناخت چهره‌ها
- (ج) حروف چاپی خیلی کوچک به نظر می‌رسند
- (د) بعضی از بخش‌های نوشته‌ها دیده نمی‌شوند

سوال ۴۳ - وضعیت‌دهی در ویلچر برای بیماران TBI را باید از کدام ناحیه شروع کرد؟

- (الف) لگن
- (ب) تنه
- (ج) پاها
- (د) سر و گردن

سوال ۴۴ - کدام مورد در درمان عدم هماهنگی بیماران مخچه‌ای صحیح نیست؟

- (الف) استفاده از بینایی تاکید می‌شود
- (ب) از دامنه‌ی کم حرکتی شروع و تدریجا پیشرفت می‌کند
- (ج) حرکت از صفحه افقی آغاز می‌شود
- (د) مسیر حرکت مطابق با توانایی مراجع انتخاب می‌شود

سوال ۴۵ - چاقوی quad-quip برای چه نوع بیمارانی مناسب است؟

- (الف) بیمارانی که در پروگزیمال اندام فوقانی مشکل دارند
- (ب) بیمارانی که قدرت کافی در بازو دارند
- (ج) بیمارانی که حداقل عملکرد عضلانی را دارند
- (د) بیمارانی که کنترل تنه و سر مناسب دارند

سوال ۴۶ - head wand برای چه بیمارانی مناسب است؟

- (الف) بیمارانی که عملکرد دست - بازو کافی ندارند
- (ب) بیماران همی‌پلژی
- (ج) بیماران کره
- (د) بیماران پارکینسون

سوال ۴۷ - در کدام مراحل بیماری آلزایمر، به ترتیب (از راست به چپ) بیمار شغل خود را از دست می‌دهد، و در

بیشتر موارد IADL مشکل دارد؟

- (الف) مراحل ۳ و ۲
- (ب) مراحل ۲ و ۳
- (ج) مراحل ۲ و ۱
- (د) مراحل ۱ و ۲

سوال ۴۸ - کدام گزینه در مداخلات کاردرمانی برای بیماران آلزایمر با توجه به مرحله بیماری، صحیح است؟

- (الف) در مراحل اولیه تمرکز بر self-care و در مراحل بعدی Mobility
- (ب) در مراحل اولیه تمرکز بر Communication و در مراحل بعدی Self-care
- (ج) در مراحل اولیه تمرکز بر driving skills و در مراحل بعدی Home management
- (د) در مراحل اولیه تمرکز بر safety و در مراحل بعدی leisure