

سوال ۴۹ - در مرحله ۵ بهبودی برونستروم ویژگی‌های دست کدام است؟

الف) Release وجود ندارد ولی hook grasp وجود دارد

ب) حرکات شست وجود دارد - lat. Prehension وجود ندارد

ج) palmar prehension و spherical grasp وجود دارد

د) انگشتان کمی خم هستند و Gross grasp وجود دارد

سوال ۵۰ - بازتاب‌های ابتدایی، تغییرات روانی، آپراکسیا، بی‌اختیاری مثانه و روده بزرگ، همی‌پلژی قسمت مخالف

همراه با ضعف شدید عضلات صورت، زبان و پروگزیمال بازو از علائم CVA به دنبال درگیری کدام شریان است؟

الف) Posterior cerebral artery

ب) Anterior cerebral artery

ج) Internal carotid artery

د) Middle cerebral artery

سوال ۵۱ - در نوزاد متولد شده با دیستروفی عضلانی بهتر است اسپلینت را از چه جنسی تهیه کرد؟

الف) Low temperature thermoplastic

ب) High temperature thermoplastic

ج) Plaster

د) Fome

سوال ۵۲ - در NICU کدام یک از وسایل زیر برای Positioning بیشترین کارایی را دارد؟

الف) Pillow ب) Blanket rolls ج) Snuggle-up د) Z-flo

سوال ۵۳ - حداکثر زمان استفاده از Static splint در کودکان چند ساعت در روز است؟

الف) ۱-۲ ساعت ب) ۲-۴ ساعت ج) ۴-۶ ساعت د) ۶-۸ ساعت

سوال ۵۴ - کدام عبارت در مورد ارتقای مهارت‌های توجه بینایی صحیح است؟

الف) از فعالیت‌هایی استفاده کنیم که بینایی و حس عمقی را تحریک می‌کنند.

ب) فعالیت‌ها از Sustained attention به سمت divided attention پیش بروند.

ج) از درون داده‌های بینایی و شنوایی همزمان استفاده شود.

د) به جای کل، به اجزای فعالیت توجه شود.

سوال ۵۵ - کدام یک از فعالیت‌های زیر برای افزایش تمایز راست و چپ و آمادگی برای نوشتن مناسب است؟

الف) برداشتن اشیای کوچک

ب) حرکت دادن کلید از کف دست به سمت نوک انگشتان

ج) عبور از داخل موانع همراه با چرخش تنه

د) رنگ کردن اشکال