

سوال ۱۱۶ - در کدام حالت زیر مصرف غذا زیاد می شود؟

- الف) تخریب هیپوتالاموس جانبی
 ب) فعال شدن نورون های NPY هسته قوسی
 ج) تحریک گیرنده های لپتین هیپوتالاموس
 د) فعال شدن نورون های پرواپیوملانوکورتین هسته قوسی

سوال ۱۱۷ - منطقه تفسیری عمومی (General Interpretive Area) مغز کدام است؟

- الف) ارتباطی لیمبیک ب) ورنیکه ج) بروکا د) لوب فرونتال

سوال ۱۱۸ - کدام مورد زیر در اثر آسیب مخچه رخ می دهد؟

- الف) لرزش استراحتی ب) هیپوتونی ج) اختلال حس پیکری د) افزایش حرکات ارادی

سوال ۱۱۹ - نوروترانسمیتر مسیر قشر مغز به استریاتوم کدام است؟

- الف) گلوتامات ب) گابا ج) دوپامین د) سروتونین

سوال ۱۲۰ - انتقال پیام کدام یک از طعم های زیر در سلول های چشایی صرفاً از طریق کانال های یونی صورت می گیرد؟

- الف) شیرینی ب) تلخی ج) شوری د) Umami

زبان عمومی

Part one: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

121 . In severe combined immunodeficiency, lack of an enzyme means that toxic waste builds up inside immune system cells, killing them and thus the immune system.

- a. reinforcing b. devastating c. realigning d. decoding

122 . In the job market, some people might fail to be employed because of their to certain diseases that might necessitate absence from the job.

- a. inclination b. contribution c. susceptibility d. immunity

123 . Mild sadness and disappointment can mostly be resolved by a/n walk in nearby parks.

- a. invigorating b. demotivating c. discouraging d. intimidating

124 . The socially anxious individuals are recommended to professionals for help.

- a. put off b. resort to c. refrain from d. withdraw from