

سوال ۸۶ - کدام تکنیک زبانی تسهیلی در مثال زیر توسط والد استفاده شده است؟  
«کودک ماشین اسباب بازی را در دست دارد و صداسازی می کند، و والد به کودک می گوید: آن یک ماشین است.»

الف) Linguistic Mapping

ب) Expansion and Modeling

ج) Parallel Talk

د) Self-Talk

سوال ۸۷ - شناسایی کدام مجموعه آسان تر است؟

الف) پول، طول، تور، پوک

ب) کرم، آش، نور، کیف

ج) چشم، چشمک، چمدان، بیمارستان

د) سار، سر، سیر، سور

سوال ۸۸ - همه موارد از تفاوت کودکان با بزرگسالان در مقوله کم شنوایی است، به استثنای:

الف) کم شنوایی متقارن در کودکان بیشتر از بزرگسالان است.

ب) کودکان به فشار صوتی بیشتری نیاز دارند تا مانند بزرگسالان گفتار را تشخیص دهند.

ج) آستانه های ردیابی محرکات صوت خالص در زمینه نویز در کودکان کمتر از بزرگسالان است.

د) الگوهای کم شنوایی در کودکان نسبت به بزرگسالان تعدد بیشتری دارد.

سوال ۸۹ - در ارزیابی شنوایی کودکان برای تجویز سمعک تخمین آستانه حداقل در کدام دو فرکانس توصیه شده است؟

الف) ۴ kHz و ۰/۵ (ب) ۴ kHz و ۱ (ج) ۴ kHz و ۲ (د) ۲ kHz و ۰/۵

سوال ۹۰ - در صورتی که آستانه های باسمعک در میدان صوتی ..... دسی بل HL یا بهتر باشد، نشان دهنده

شنیده شدن آرام ترین بخش های گفتار توسط بیمار است.

الف) ۲۰ (ب) ۳۰ (ج) ۴۰ (د) ۵۰

سوال ۹۱ - کدام گزینه در مورد جلسات تنظیم سمعک در بزرگسالان درست است؟

الف) جلسه اول: قضاوت در مورد بلندی تون خالصی که نزدیک پرده گوش ارائه می شود.

ب) جلسه دوم: مشاوره، ارزیابی کامل ادیومتریکی و برآورد انگیزه بیمار برای گرفتن سمعک

ج) جلسه سوم: ارزیابی گوش واقعی و قضاوت بلندی صدا برای محرکات گفتاری با سمعک

د) جلسه چهارم: ارزیابی سمعک با استفاده از پرسشنامه مخصوص، ۱۵ روز پس از تنظیم اول

سوال ۹۲ - مزیت تجویز دوگوشی برای وضوح گفتار در چه سطحی از کم شنوایی بیشترین مقدار را داراست؟

الف) کم شنوایی متوسط

ب) کم شنوایی شدید

ج) کم شنوایی متوسط - شدید

د) کم شنوایی عمیق