

سوال ۱۰۸ - تفاوت TEOAE ثبت شده در کودکان و بزرگسالان این است که ...

- (الف) در کودکان وقتی کم شنوایی بالاتر از 30dB باشد، ثبت نمی‌شود.  
 (ب) در بزرگسالان فرکانس‌های بالای بیشتری را در بر می‌گیرد.  
 (ج) در کودکان دامنه کوتاهتری دارد.  
 (د) در بزرگسالان همبستگی بین آستانه‌های ادیومتریکی و دامنه به دست آمده ضعیف است.

سوال ۱۰۹ - کدام گزینه درباره VRA نادرست است؟

- (الف) اساس VRA، COR است.  
 (ب) برای سنین ۵-۲ سالگی طراحی شده است.  
 (ج) پاسخ‌های غیرارادی یا خودبخودی نیز قابل قبول است.  
 (د) وجود مشکلات کنترل حرکتی، باعث از بین رفتن پاسخ جهت‌یابی می‌شود.

سوال ۱۱۰ - کدام گزینه درباره توانایی‌های شنیداری نوزادان نادرست است؟

- (الف) اگر اصوات تحت کنترل کودک یک ساله قرار گیرد، توجه محسوسی به شنیدن آن‌ها می‌نماید.  
 (ب) نوزاد دو ماهه نیز می‌تواند ریتم گفتار را تشخیص دهد.  
 (ج) نوزاد سه ماهه با شنیدن صوت، لوکالیزیشن دقیق دارد.  
 (د) نوزاد یک تا چهار ماهه، تکیه‌های زبان مادری را تشخیص می‌دهد.

سوال ۱۱۱ - کدام گزینه از روش‌های ارزیابی شنوایی ساجکتیو برای کودکان ۶-۲۴ ماهه نیست؟

- (الف) TROCA (ب) روش‌های لوکالیزیشن (ج) BOA (د) VRA

سوال ۱۱۲ - ارزیابی ایمیتمانس در کودکان سخت‌شنوا با چه هدفی انجام می‌شود؟

- (الف) پیش‌گویی میزان کم‌شنوایی  
 (ب) پایش وضعیت گوش میانی  
 (ج) رفع مشکلات سمعک  
 (د) بررسی انتقال استخوانی

سوال ۱۱۳ - کمترین سطح شدت محرک گفتاری (بر حسب dBHL) در آزمایش شنوایی نوازادان ۹-۷ ماهه برای

مشاهده پاسخ لوکالیزیشن چقدر است؟

- (الف) ۲۰ (ب) ۱۵ (ج) ۱۰ (د) ۵

سوال ۱۱۴ - مجموعه آزمون‌های بررسی سیستم دهلیزی کودکان همه موارد زیر را شامل می‌شود، بجز:

- (الف) صندلی گردان (ب) وضعیتی (ج) ENG (د) VEMP