

سوال ۱۱۵ - در مورد بیماری‌های خودایمنی کودکان عبارت نادرست کدام است؟

- الف) از نشانه‌های این بیماری کم شنوایی غیر سندرومیک و ترکیبات غیرطبیعی سرم خون است.  
 ب) کم شنوایی این بیماران به صورت یک طرفه و پیشرونده ظاهر می‌شود.  
 ج) کم شنوایی به صورت حسی - عصبی ظاهر شده و تا ناشنوایی کامل پیش می‌رود.  
 د) استفاده از سمعک در این کودکان کارساز نیست.

سوال ۱۱۶ - کم شنوایی در کودکان مبتلا به دیابت:

- الف) نشانه‌ای شایع است.  
 ب) دو طرفه و غیر قرینه است.  
 ج) در سطح متوسط مایل به شدید است.  
 د) حسی - عصبی و پیشرونده است.

سوال ۱۱۷ - کدام گزینه درباره ارزیابی شنوایی کودکان چند معلولیتی درست است؟

- الف) شرطی کردن تأثیری ندارد.  
 ب) شرطی کردن کلاسیک موثرتر است.  
 ج) شرطی کردن با محرک‌های بینایی بهتر است.  
 د) شرطی کردن با محرک‌های لامسه‌ای بهتر است.

سوال ۱۱۸ - کدام گزینه درباره رشد طبیعی رفتارهای شنوایی کودک ۱۰ ماهه نادرست است؟

- الف) به لحن گفتاری شاد و خشمگین بطور متفاوت پاسخ می‌دهد.  
 ب) می‌تواند زیر و بمی صدایش را تغییر دهد.  
 ج) گنجینه واژگان بیانی ۲۰ کلمه دارد.  
 د) از دستورات ساده پیروی می‌کند.

سوال ۱۱۹ - کم شنوایی حسی عصبی فرکانس‌های بالا ویژگی کدام سندرم زیر است؟

- الف) Fanconi's Anemia (ب) Treacher Collins (ج) Apert (د) Down

سوال ۱۲۰ - در کدام آزمون شنوایی، آزمایشگر نقش غیرفعال (Passive) دارد؟

- الف) VROCA (ب) لوکالیزیشن شرطی شده (ج) ادیومتری بازی (د) BOA

### زبان عمومی

#### Part one: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by using the most suitable word or phrases below each one.

121 . In Alzheimer's disease, forgetfulness may be ..... and bearable at first, but the loss of memory worsens over time until it interferes with most aspects of daily living.

- a. nasty                      b. fatal                      c. subtle                      d. intense