

سوال ۴۹ - در مقایسه بین TEOAE و DPOAE کدام یک کم شنوایی را بهتر تشخیص می دهند؟

- الف) TEOAE در فرکانس ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز و DPOAE در فرکانس ۴۰۰۰ هرتز  
 ب) TEOAE در فرکانس ۲۵۰ هرتز و DPOAE در فرکانس ۵۰۰ هرتز  
 ج) TEOAE در فرکانس ۵۰۰ هرتز و DPOAE در فرکانس ۱۲۰۰ هرتز  
 د) به هیچ وجه تفاوتی ندارند

سوال ۵۰ - کدام یک از موارد زیر در صدادرمانی بیماران مبتلا به وزوز درست است؟

- الف) استفاده مداوم از سمک یا وسایل تلفیقی ضروری است.  
 ب) شدت نویز دستگاه در حدی تنظیم شود که وزوز کاملاً حذف شود.  
 ج) هدف اصلی از صدادرمانی از بین بردن وزوز است.  
 د) در بیماران کم شنوا، نخستین گزینه انتخابی سمک است.

سوال ۵۱ - نیاز بیماری که در مورد وزوز خود نگرانی (concern) داشته باشد کدام است؟

- الف) اطلاعات پایه/ مشاوره روانشناختی  
 ب) اطلاعات پایه/ مرور راه های درمانی  
 ج) مشاوره/ مرور راه های درمانی  
 د) مشاوره/ صدا درمانی

سوال ۵۲ - جهش ژن CjB2 موجب چه اختلالی در گوش داخلی می شود؟

- الف) اختلال گردش سدیم در حلزون  
 ب) اختلال گردش پتاسیم در حلزون  
 ج) اختلال نرونهای اسپیرال گانگلیون  
 د) اختلال خون رسانی اسپیرال گانگلیون

سوال ۵۳ - ویژگی کم شنوایی ناشی از مصرف اریترومايسين کدام است؟

- الف) ناگهانی و برگشت پذیر (ب) تدریجی و برگشت پذیر (ج) ناگهانی و دائمی (د) تدریجی و دائمی

سوال ۵۴ - در صورت از بین رفتن ناگهانی عملکرد لایبرنت یا عصب وستیبول بطور کامل، چه نیستاگموسی دیده می شود؟

- الف) عمودی بطرف ضایعه  
 ب) افقی و پیچشی (Torsion) بطرف ضایعه  
 ج) افقی و پیچشی (Torsion) به سمت مقابل به ضایعه  
 د) افقی و عمودی به سمت مقابل به ضایعه

سوال ۵۵ - عامل اتیت میانی بدخیم در اکثر بیماران دیابتی چیست؟

- الف) پسودومونا (ب) استرپتوکوک (ج) استافیلوکوک (د) کاندیدا