

- ۴۰ - مصرف دارو در کدامیک از زمان‌های بارداری می‌تواند بیشترین خطر تراتوژنیک را داشته باشد؟  
الف) هفته اول حاملگی (ب) هفته ۸-۴ (ج) هفته ۳۲-۲۴ (د) هفته ۳۸-۳۶
- ۴۱ - نوزادی در هفته ۳۴ بارداری مرده به دنیا آمده است. این نوزاد را در کدامیک از دسته‌های میرایی زیر قرار می‌دهید؟  
الف) مرده زائی (ب) میرایی حول زایمانی (ج) میرایی دوره نوزادی (د) سقط جنین
- ۴۲ - معنی عبارت «پیگیری روز به روز فعالیت‌ها در ضمن اجرا به منظور پیشرفت کار برابر برنامه و مطابق جدول زمان‌بندی» کدام گزینه زیر است؟  
الف) Evaluation (ب) Monitoring (ج) Administration (د) Control
- ۴۳ - معنی عبارت «مجموعه مقررات اجرایی به طوری که حداکثر بهره‌گیری از منابع و فعالیت‌ها را تضمین کند» کدام گزینه زیر است؟  
الف) Target (ب) Objective (ج) Procedure (د) Strategy
- ۴۴ - کدامیک از علل میرایی شیر خواران از علل فرهنگی - اجتماعی است؟  
الف) وزن هنگام تولد (ب) سن مادر (ج) چند زایی (د) عدم تغذیه با شیر مادر
- ۴۵ - کدامیک از جملات زیر در رابطه با شاخص‌های رشد کودکان صحیح است؟  
الف) مقدار وزن نشان دهنده پیشامدهای قبلی تندرستی است.  
ب) کم بودن قد به ازای سن نشانه کم‌غذایی می‌باشد.  
ج) مقدار قد بیانگر وضعیت تندرستی فعلی کودک است.  
د) وزن، یک شاخص مناسب اندازه‌گیری پایدار رشد است.
- ۴۶ - هدف کاهش مدت بیماری روانی در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟  
الف) سطح سوم (ب) سطح دوم (ج) سطح اول (د) همه سطوح
- ۴۷ - نشانه بالینی مسمومیت با سرب با چند میکروگرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر در بدن ظهور پیدا می‌کند؟  
الف) ۷۰ (ب) ۲۷۰ (ج) ۷ (د) ۱۷۰
- ۴۸ - ارتفاع دیواره اطراف چاه آب بهداشتی حداقل باید چند سانتیمتر باشد؟  
الف) ۴۰ (ب) ۷۵ (ج) ۱۰۰ (د) ۱۲۰
- ۴۹ - مهمترین جزء برنامه‌های بهداشت مدارس کدام است؟  
الف) آموزش بهداشت (ب) بهداشت فردی (ج) بهداشت محیط (د) بهداشت جمعی و روانی
- ۵۰ - کدامیک از لیپوپروتئین‌های زیر پیشگویی‌کننده قوی تری برای بروز بیماری‌های عروقی قلب (CHD) می‌باشد؟  
الف) LDH (ب) HDL (ج) آپولیپروتئین A و B (د) لیپوپروتئین‌های با تراکم بسیار کم (VLDL)