

- ۸۵ - مادری از دفع قهوه‌ای متمایل به سبز رنگ نوزاد خود در روز سوم بعد از شروع تغذیه نگران است، پاسخ مناسب پرستار کدام است؟  
 الف) این حالت طبیعی است.  
 ب) احتمالاً وجود صفرا است.  
 ج) نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.  
 د) به دلیل کاهش حرکات روده است.
- ۸۶ - درصد خواب فعال (Active Sleep) نوزادان نارس از کل خواب کدام است؟  
 الف) ۱۰ (ب) ۳۰ (ج) ۵۰ (د) ۷۰
- ۸۷ - مهم‌ترین نشانه فتق دیافراگمی مادرزادی در نوزادان کدام است؟  
 الف) دیسترس تنفسی حاد (ب) شکم برجسته (ج) دهان کف آلود (د) افت ضربان قلب
- ۸۸ - در کدام یک از موارد زیر، نیاز به دریافت مایعات در کودکان افزایش می‌یابد؟  
 الف) نارسایی احتقانی قلب  
 ب) نارسایی کلیه (اولیگوریک)  
 ج) استفاده از تهویه مکانیکی  
 د) سوختگی
- ۸۹ - در کودکی که دچار اسهال خفیف شده است، توصیه‌ی شما کدام است؟  
 الف) مصرف محلول‌های الکترولیتی (ORS)  
 ب) مصرف آب میوه  
 ج) تزریق وریدی رینگر لاکتات  
 د) ناشتا نگه داشتن کودک
- ۹۰ - رژیم غذایی مناسب در کودکان مبتلا به سوختگی کدام است؟  
 الف) پرپروتئین و کم‌کالری (ب) پرپروتئین و پرکالری (ج) کم‌پروتئین و کم‌کالری (د) کم‌پروتئین و پرکالری
- ۹۱ - در کدام روش تجویز اکسیژن، احتمال نفخ و ناراحتی شکم وجود دارد؟  
 الف) ماسک اکسیژن (ب) چادر اکسیژن (ج) سوند بینی (د) هود اکسیژن
- ۹۲ - در نوزاد مبتلا به تنگی هیپرتروفیک پیلور، قبل از عمل جراحی بهترین روش تغذیه کدام است؟  
 الف) استفاده از قطره‌چکان (ب) لوله‌ی بینی معدی (ج) راه وریدی (د) گاستروستومی
- ۹۳ - در پرستاری از کودک تحت درمان با شیمی‌درمانی، بهترین توصیه‌ی شما به والدین کدام است؟  
 الف) تشویق به بازی با همسالان  
 ب) شرکت در برنامه‌های ورزشی مدرسه  
 ج) خواب منظم و استراحت دوره‌ای  
 د) تشویق به فعالیت‌های اجتماعی
- ۹۴ - بعد از عمل برداشتن لوزه، در صورتی که کودک کاملاً بیدار نباشد، پوزیشن مناسب کدام است؟  
 الف) خوابیده به پشت (ب) خوابیده به پهلو (ج) نیمه نشسته (د) نشسته