

۲۴ - یکی از دلایلی که باعث می‌شود جذب دارو در افراد سالم‌مند افزایش بیشتری داشته باشد، کدام مورد است؟

- الف) خالی نگهداشتن معده توسط فرد سالم‌مند
- ب) توقف طولانی‌تر مواد خوراکی در دستگاه گوارش
- ج) بالا رفتن میزان آلبومین خون در روند سالم‌مندی
- د) جذب زودهنگام دارو به دلیل زیادی مصرف مایعات

۲۵ - کدام مورد زیر از نظر «تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از روند سالم‌مندی بر سیستم ایمنی بدن» صحیح است؟

- الف) تشدید کلیه فرآیندهای التهابی ناشی از کم‌کاری مغز استخوان
- ب) کاهش فعالیت ماکروفازی و تقویت فعالیت سلول‌های B
- ج) شدت یافتن پاسخ‌های التهابی ناشی از پرکاری سلول‌های T
- د) کاهش پاسخ‌های التهابی و اعمال مرتبط با سلول‌های T

۲۶ - بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) با تشخیص انفارکتوس میوکارد در نیمه‌های شب دچار تنگی نفس، اتساع وریدهای گردن و سرفه‌های بدون وقفه همراه با خلط می‌شود. مناسب‌ترین و ضروری‌ترین اقدام پرستاری برای این بیمار چیست؟

- الف) تجویز اکسیژن با غلظت کم
- ب) تجویز پتیدین با مقادیر کم (۲ تا ۵ میلی‌گرم)
- ج) قرار دادن بیمار در وضعیت نشسته قائم
- د) گرفتن نوار قلب

۲۷ - کدام یک از مراقبت‌های پرستاری در بیماران تحت درمان با ترومبوლیتیک‌ها صحیح است؟

- الف) استفاده مداوم از کاف فشار خون غیرتهاجمی
- ب) گرفتن نمونه خون از خط داخل وریدی
- ج) استفاده از تزریقات عضلانی در صورت نیاز
- د) کنترل خونریزی‌ها فقط با استفاده از فشار مستقیم

۲۸ - به منظور تامین خونرسانی کافی به بافت‌ها در بیمار مبتلا به سندروم کرونری حاد، مهم‌ترین اقدام پرستاری کدام است؟

- الف) رعایت پوزیشن خوابیده به پشت
- ب) کنترل مستمر درجه حرارت پوست و نبض‌های محیطی
- ج) انجام ماساژ پوستی و تغییر وضعیت
- د) حمام گرم حداقل یک بار در روز با استفاده از وان

۲۹ - بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) با تشخیص انفارکتوس حاد دچار ایست قلبی ناشی از فیبریلاسیون بطنی شده است. اولین اقدام پرستاری در احیا قلبی- ریوی کدام است؟

- الف) تجویز اکسیژن
- ب) حفظ راه هوایی
- ج) تزریق اپی‌نفرین
- د) ماساژ قلبی

۳۰ - اولین اقدام پرستاری در سندروم کمپارتمان ناشی از قالب گچی چیست؟

- الف) تزریق مسکن و ثبت در پرونده
- ب) بالا نگهداشتن عضو گج گرفته
- ج) اطلاع به پزشک معالج
- د) باز کردن قالب گچی