

۳۱ - مداخله پرستاری بعد از انجام بیوپسی استخوان کدام است؟

- الف) بالا نگه‌داشتن اندام به مدت ۸ ساعت
- ب) بانداز کشی محل بیوپسی به مدت ۲۴-۴۸ ساعت
- ج) استفاده از کیف یخ در محل بیوپسی
- د) پانسمان کردن محل بیوپسی

۳۲ - مداخلات پرستاری در بیمار مبتلا به کوفتگی کدام است؟

- الف) استراحت و بالا نگه داشتن عضو مصدوم، استفاده از کیسه یخ و پانسمان فشاری
- ب) استراحت، تجویز مسکن، کیسه آب گرم و فعالیت محدود
- ج) کیسه آب گرم و سرد به صورت متناوب، پانسمان فشاری و فعالیت محدود
- د) استراحت، مصرف مایعات فراوان، کیسه آب گرم و پانسمان فشاری

۳۳ - کدام یک از مراقبت‌های زیر در مورد بیمار دچار شکستگی بسته توسط پرستار ارائه می‌شود؟

- الف) آموزش روش صحیح کنترل درد و ورم به بیمار و خانواده
- ب) استراحت و فعالیت متناوب
- ج) کمک به گچ‌گیری با استفاده از کشش
- د) کمپرس گرم و سرد به تناوب

۳۴ - کدام یک از موارد زیر هشدار به پرستار برای افزایش شدت آتلکتازی است؟

- الف) تاکی‌پنه، هیپوتانسیون و سرگیجه
- ب) عدم تحمل فعالیت، کم‌آبی و تشنگی مفرط
- ج) تاکی‌پنه، دیس‌پنه و هیپوکسی خفیف تا متوسط
- د) دیس‌پنه، کم‌آبی و کاهش اشتها

۳۵ - در عفونت‌های قسمت فوقانی دستگاه تنفسی کدام مداخله پرستاری توصیه می‌شود؟

- الف) افزایش مایعات دریافتی و استفاده از بخور به منظور کاهش غلظت ترشحات
- ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده با نظارت پرستار و مصرف داروهای بازکننده برونش‌ها
- ج) استفاده از دوش آب گرم همراه با مصرف به موقع داروها
- د) تعادل بین استراحت، فعالیت و کنترل مصرف مایعات دریافتی

۳۶ - مهم‌ترین توصیه پرستاری به دنبال خونریزی کنترل شده بینی کدام است؟

- الف) مصرف مایعات کافی، کنترل علائم حیاتی و کنترل راه هوایی
- ب) اجتناب از فعالیت‌های بدنی سنگین و عدم مصرف غذای تند و داغ و سیگار
- ج) کنترل راه هوایی، محدودیت مصرف مایعات و مواد غذایی
- د) کنترل راه هوایی، علائم حیاتی و محدودیت مصرف مایعات

۳۷ - کدام یک از موارد زیر از تشخیص‌های پرستاری در بیمار مبتلا به پنومونی است؟

- الف) خطر کمبود دریافت پروتئین به علت مشکلات گوارشی
- ب) خطر نقصان در حجم مایعات به علت تب و افزایش تعداد تنفس
- ج) خطر عفونت سیستمیک به علت ضعف سیستم ایمنی
- د) خطر کاهش سطح هوشیاری و غش به علت کاهش قند خون