

۴۴ - پس از جراحی ماستوئیدکتومی و تمپانوپلاستی، آموزش صحیح کدام است؟

- الف) احتمال احساس دردهای متناوب و تیز در گوش، ۲-۳ هفته بعد از عمل
- ب) خود داری از بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن تا ۲ ماه بعد از عمل
- ج) گزارش فوری هرگونه احساس خشکی دهان و اختلال در حس چشایی به پزشک
- د) گزارش هرگونه کاهش شنوایی در روزهای اولیه پس از عمل به پزشک

۴۵ - آموزش مناسب به بیمار مبتلا به هیدروپس آندولنف کدام است؟

- الف) کاهش مصرف مایعات
- ب) مصرف غذاهای حاوی نمک
- ج) استفاده از میان وعده ها
- د) مصرف قهوه هنگام سرگیجه

۴۶ - در صورت داشتن NGT متصل به ساکشن، برای پیشگیری از هیپوناترمی، کدام اقدام ضروریست؟

- الف) ثابت نگهداشتن سطح سدیم خون کمتر از ۱۲۵ mEq/L
- ب) کنترل استفراغ بیمار با دادن داروهای ضد تهوع
- ج) برقراری خط وریدی با سرم قندی ۵٪
- د) شستشوی لوله معده با محلول ایزوتونیک سالین

۴۷ - ضروریست برای کنترل فلبيت ناشی از تزریق پتاسیم وریدی، از سر سوزن نازک استفاده شود. مکانیسم اثر این اقدام کدام مورد است؟

- الف) کنترل درد ناشی از ماده تزریقی
- ب) به حداکثر رسانیدن جریان خون در اطراف سر سوزن
- ج) عدم نیاز به تزریقات مکرر ناشی از خرابی رگ
- د) امکان استفاده از رگهای باریک در بیمار

۴۸ - بیماری در بخش ارولوژی بدلیل نارسایی مزمن کلیه و علائم تهوع، بی اشتهایی و استفراغ بستری شده است. هدف اصلی پرستار در مراقبت از بیمار کدام مورد است؟

- الف) تعادل آب و الکترولیت ها، رژیم غذایی کم پروتئین با سدیم بالا و پتاسیم کم
- ب) کاهش تهوع و استفراغ و برقراری تعادل مایعات و الکترولیتها
- ج) رژیم غذایی با پروتئین محدود و ارزش بالا، پرکالری، سدیم و پتاسیم کم
- د) کاهش تهوع، رژیم غذایی کم کالری با سدیم و پتاسیم بالا

۴۹ - علایم و اقدامات پرستاری مرتبط با پیلو نفریت حاد کدام است؟

- الف) درد ناحیه کلیه، تب - محدود سازی مصرف مایعات
- ب) ایگوری، درد زیر شکم - محدودیت مصرف مایعات
- ج) تب، لکوسیتوز، وجود باکتری در ادرار، تهوع و استفراغ - پایش میزان مایعات دریافتی
- د) لکوپنی، کاهش درجه حرارت و میزان دفع ادرار - دادن مایعات زیاد به بیمار

۵۰ - کدامیک از موارد زیر در مراقبت پس از بیوپسی کبد صحیح است؟

- الف) خوابانیدن بیمار به سمت چپ و کنترل علایم حیاتی هر ۱۵ دقیقه
- ب) خوابانیدن بیمار به سمت راست و آموزش بیمار جهت جلوگیری از سرفه و عطسه
- ج) جلوگیری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یکماه و کنترل علایم حیاتی تا ۲۴ ساعت اول
- د) قرار دادن بیمار در حالت خوابیده به پشت و بی حرکت کردن او به مدت ۲۴ ساعت