

۵۱ - کدامیک از علایم ذیل نشانه‌های کتو اسیدوز دیابتی (DKA) است؟

- (الف) دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، هایپرونوتیلاسیون و تنفس با بوی میوه
- (ب) کاهش قند خون، هیپوونوتیلاسیون و تنفس با بوی سیب گندیده
- (ج) هایپرگلیسمیا، هیپوونوتیلاسیون و دردهای شکمی
- (د) کوما، هایپرونوتیلاسیون، هیپوگلیسمیا

۵۲ - در مراقبت از بیماری که تحت پروسیجر lumber puncture قرار گرفته است، جهت پیشگیری از سر درد، پرستار چه اقداماتی باید انجام دهد؟

- (الف) بالا قرار دادن سر بیمار و محدودیت در مصرف مایعات
- (ب) مصرف مسکن، دادن مایعات به بیمار، استراحت و پوزیشن prone
- (ج) محدودیت مصرف مایعات، مصرف مسکن و پوزیشن به پهلو
- (د) کنترل بیمار از نظر خونریزی، محدودیت مصرف مایعات و پوزیشن prone

۵۳ - اولین علامت افزایش فشار داخل مغز (ICP) که پرستار بایستی آن را تشخیص دهد کدام است؟

- (الف) میدریاز دو طرفه و عدم پاسخگویی بیمار
- (ب) نامتقارن شدن مردمکها، افزایش فشار خون و کاهش نبض
- (ج) عدم هوشیاری بیمار، افزایش نبض و بی قراری
- (د) تغییر در سطح هوشیاری و آهسته صحبت کردن بیمار، تاخیر در عکس العملها

۵۴ - کدامیک از تشخیص‌های پرستاری ذیل در مورد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) صحیح می‌باشد؟

- (الف) اختلال در حرکت فیزیکی در ارتباط با ضعف عضلات و اسپاسم
- (ب) اختلال در اکسیژن رسانی در ارتباط با درگیری سیستم تنفسی
- (ج) اختلال در بینایی در ارتباط با درگیری سیستم اعصاب مرکزی
- (د) اختلال در سیستم دفعی در رابطه با درگیری نسج کلیه

۵۵ - جهت بهبود وضعیت حرکتی بیمار مبتلا به پارکینسون کدام مورد زیر صحیح است؟

- (الف) استفاده به موقع داروها و ورزشهای غیرفعال
- (ب) ورزش در هوای گرم و پیاده روی سریع
- (ج) استفاده از ماساژ و حمام گرم، آموزش ورزشهای فعال و غیرفعال
- (د) استفاده از کیف آب سرد، ورزش فعال و استراحت بیشتر

۵۶ - در بررسی پوست اطراف استوما در بیمار تحت کلستومی کدام مورد نشان دهنده سلامت تمامیت پوست است؟

- (الف) رنگ پریده و سفید
- (ب) صورتی متمایل به قرمز
- (ج) مرتوب و قرمز و دردناک

۵۷ - در ارزیابی بیماری که گواوژ تغذیه‌ای دارد کدام مورد را باید پرستار در نظر بگیرد؟

- (الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن صاف در حین ورود مایعات تغذیه‌ای
- (ب) کاهش قند خون و افزایش ناگهانی وزن بدن
- (ج) تعویض سوند معده هفته‌ای یکبار
- (د) بررسی میزان حجم باقیمانده قبل از ورود مایعات تغذیه‌ای