

۱۲ - در سندرم Refeeding خطر همه وجود دارد بجز:

- (الف) هیپوکالمی (ب) هیپوناتررمی (ج) هیپومنیزیمی (د) هیپوفسفاتمی

۱۳ - همه موارد در مبتلایان به GERD توصیه می شود بجز:

- (الف) نخوردن وعده های پر چرب
 (ب) اجتناب از خوردن غذاهای کافئین دار
 (ج) نخوردن فیر کافی
 (د) کاهش وزن در صورت ابتلاء به افزایش وزن

۱۴ - کدام یک از مواد غذایی زیر کارنیتین بیشتری دارد؟

- (الف) کره (ب) بستنی (ج) شیر پر چرب (د) ماهی

۱۵ - کدام داروها به ترتیب (راست به چپ) سبب کاهش و افزایش اشتها می شوند؟

- (الف) فلوکستین، آلپرازولام
 (ب) آلپرازولام، فلوکستین
 (ج) سیپروھپتادین، امی تریپتیلین
 (د) امی تریپتیلین، سیپروھپتادین

۱۶ - در کدام حالت نیتروژن بیشتری به صورت آمونیاک از ادرار دفع می شود؟

- (الف) رژیم پر پروتئین
 (ب) رژیم کم پروتئین
 (ج) دو روزه داری
 (د) در تمامی شرایط دفع آمونیاک ثابت است

۱۷ - میزان وزن گیری توصیه شده برای سه ماهه سوم بارداری در مادرانی که BMI آنها قبل از بارداری بین ۱۹/۸ الی

۲۶ بوده است چند کیلوگرم در هفته در نظر گرفته می شود؟

- (الف) ۰/۳ (ب) ۰/۴ (ج) ۰/۵ (د) ۰/۶

۱۸ - بیشترین افزایش نیاز در دوران بارداری مربوط به کدام یک است؟

- (الف) آهن (ب) پروتئین (ج) انرژی (د) روی

۱۹ - رژیم غذایی ۲۲۰۰ تا ۲۸۰۰ کیلوگالری تمام نیازهای زنان باردار را تأمین می کند بجز:

- (الف) روی (ب) اسیدفولیک (ج) پیریدوکسین (د) پروتئین

۲۰ - کدام یک از مواد مغذی زیر در شیر اولیه (Early Milk) نسبت به شیر رسیده (Mature Milk) بیشتر است؟

- (الف) کلسترول (ب) چربی کل (ج) اسیدهای چرب اشباع کل (د) تری گلیسرید

۲۱ - کدام یک از ویتامین های زیر حداقل مسمومیت زایی را دارد؟

- (الف) منادیون (ب) توکوفرول (ج) کلسیتریول (د) رتینول

۲۲ - کدام ماده غذایی می تواند در حذف هلیکوباکتریلوری موثر باشد؟

- (الف) کلم بروکلی (ب) هویج فرنگی (ج) کاهو (د) نخود سبز