

۶۰ - کدام پوزیشن مادر، به چرخش سر جنین مخصوصاً در روش بی حسی اپیدورال کمک می کند؟
 الف) چمباتمه ب) نیمه نشسته ج) زانوزدن د) خوابیده به پهلو

۶۱ - کدام مورد جزء اقدامات لازم در آمنیوتومی نیست؟

- الف) کنترل صدای قلب جنین قبل و بعد از آمنیوتومی
 ب) فشار فوندال یا سوپراپوبیک (یا هر دو)
 ج) سوراخ کردن کیسه آب طی انقباض رحمی
 د) تغییر یا اصلاح پوزیشن مادر به ترند لنبرگ

۶۲ - در طی لیبر، هنگامی که سر جنین در لگن پایین می آید، مثانه چه تغییری می کند؟

- الف) به طرف بالا و به سمت شکم کشیده می شود.
 ب) در داخل قوس ساکروم مسطح می شود.
 ج) به یکی از طرفین لگن جابجا می شود.
 د) در همان محل اولیه، فشرده می شود.

۶۳ - کدام مورد جزء مشخصات پایه‌ای الگوی طبیعی ضربان قلب جنین نیست؟

- الف) تغییر پذیری ضربان قلب حداقل ۲ ضربه در دقیقه
 ب) تغییرات طبیعی دامنه ۲۵ - ۶ ضربه در دقیقه
 ج) افزایش دوره‌ای ضربان قلب به میزان ۲۵ ضربه و بیش از ۱۵ ثانیه
 د) وجود تغییرات دوره‌ای پایه ضربانات قلب

۶۴ - کدام یک از گزینه‌های زیر از علایم اختلال انعقادی به دنبال دکولمان است؟

- الف) پورپورا در زیر کاف اندازه‌گیری فشار خون
 ب) دهان خشک و لته‌های صورتی
 ج) کاهش حجم مایع جداشده از لخته پس از ۰/۵ ساعت
 د) کاهش حجم لخته خون در لوله آزمایش

۶۵ - در تنگی لگن به هنگام لیبر کدام عبارت نادرست است؟

- الف) تنگی بخش میانی لگن موجب توقف عرضی سر می شود.
 ب) چنانچه فاصله دو توپروزیته ۸ سانتی‌متر شود تنگی خروجی لگن داریم.
 ج) تنگی خروجی لگن معمولاً همراه با تنگی بخش میانی لگن است.
 د) تنگی ورودی لگن مترادف با قطر کونزوگه دیاگونال کمتر از ۱۰ سانتی‌متر است.

۶۶ - کدام یک از موارد زیر در نزول جنین به هنگام زایمان تأثیری ندارد؟

- الف) فشار فوندوس رحم بر انتهای جنین
 ب) وزن و جثه جنین
 ج) اکستانسیون و راست شدن بدن جنین
 د) نیروی عضلات شکم مادر

۶۷ - چه فاصله‌ای بین انفیلتراسیون لیدوکائین و برش اپی زیاتومی مناسب‌تر است؟

- الف) ۲ یا ۳ انقباض رحمی ب) ۱ انقباض رحمی ج) ۱ یا ۲ دقیقه د) ۶ دقیقه یا بیشتر